

# คาถา 5 ย กั้นสุนัขกัด

**ย 1**

อย่าเหยียบ  
สุนัขให้โมโห



**ย 2**

อย่าเหยียบหาง, หัว, ตัว, ขา,  
หรือทำให้สุนัขตกใจ



**ย 3**

อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัด  
ด้วยมือเปล่า



**ย 4**

อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้าย  
อาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



**ย 5**

อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัข  
ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



## เมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้

**1**



ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงก้นแผล  
ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด

**2**



จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน  
สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

**3**



ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

**สุนัขกัดต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามหมอ**

ป้องกันและหลีกเลี่ยง  
ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด

## โรคพิษสุนัขบ้า




เลี้ยงสุนัข รักถูกวิธี

“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

# โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยเฉพาะพบมากที่สุดในสุนัข และรองลงมาคือแมว

## : สาเหตุการติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

## : อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

### • ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

### • ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นเต้นหงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก มานตาขยายกว้าง

### • ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปากน้ำลายไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

## : อาการที่พบในคน


ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรง บริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำปวดท้องน้อยและขากกล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

# คำแนะนำ

## สำหรับคนเลี้ยงสุนัข


1

นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)



2

ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพาดในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง



3

ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



“โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้” หากมีอาการแล้ว ตายทุกราย

หยุดปล่อยหมา  
หยุดปัญหาหมาจรจัด